



МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПИТАНИЯ В ДОУ

Первая помощь при ударе молнией

- ✓ Вызовите скорую помощь.
- ✓ Перенесите пострадавшего ребенка в безопасное место (лучше в помещение) и уложите горизонтально.

Внимание! Действие электрического тока при ударе молнии кратковременно. Пострадавший не находится под напряжением, к нему можно прикасаться, резиновые перчатки и другая защита не нужны.

- ✓ Освободите грудную клетку от одежды.
- ✓ Если ребенок в сознании, предложите теплый чай, настойку валерианы. Дайте обезболивающее средство в детской дозировке. На ожоговую рану наложите повязку, смоченную раствором фурацилина (1:1000) или накройте стерильными салфетками.
- ✓ Если ребенок без сознания, но дыхание и пульс присутствуют, укройте ребенка и уложите на бок, чтобы исключить риск западения языка и захлебывание, если начнется рвота.
- ✓ Если дыхание и пульс отсутствуют, проведите искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Проводите реанимационные мероприятия до восстановления сознания у пострадавшего либо до приезда скорой помощи. При электрическом повреждении показано тщательное и продолжительное оживление.

Пострадавшего ребенка врачи скорой должны доставить в реанимационное или хирургическое отделение.